

# La constellation du Petit Capricorne !

## Une nouvelle enquête naturaliste francilienne

Les longicornes, coléoptères de la famille des Cerambycidae (également appelés « capricornes ») se reconnaissent par leurs antennes souvent plus longues que le corps. Ils forment un vaste ensemble représenté en Île-de-France par près de 150 espèces. Le Petit Capricorne (*Cerambyx scopolii*) est emblématique du début de printemps et de la floraison des arbustes.

### Où et comment l'observer ?

Les adultes fréquentent régulièrement les **fleurs en ombelles** (aubépine, sureau, troène...) en situations ensoleillées. Ils s'observent d'avril à août avec un **pic d'activité en mai**. Les **bordures de chemins forestiers, haies champêtres, jardins et vergers** sont les lieux de prédilection pour les apercevoir. Les femelles recherchent des arbres feuillus déjà fragilisés, en particulier des **vieux fruitiers** mais aussi du **bois fraîchement coupé** pour y pondre. Les larves se nourriront de bois déperissant et séchant pendant 2 à 3 ans avant de se nymphoser...

### Bien identifier le Petit Capricorne

#### Attention aux confusions !

Au cours de vos pérégrinations vous rencontrez peut-être d'autres espèces ressemblant au Petit Capricorne, en voici quelques unes :



Quelques critères à vérifier :

Taille moyenne : 15 à 28 mm

Antennes au moins aussi longues que le corps, couvertes de fins poils blanchâtres à leur bout (surtout visible chez la femelle)

Élytres entièrement noires, à surfaces irrégulières

*Cerambyx cerdo*  
Grand Capricorne

Protégés



Grande taille : 24 à 62 mm.  
Élytres entièrement noirs à extrémités rougeâtre, à surface régulière. Antennes au moins aussi longues que le corps.  
Activité : juin-juillet

*Aegosoma scabricorne*  
Prione Ermite



Grande taille : 23 à 52 mm.  
Entièrement marron roussâtre avec des côtes longitudinales sur les élytres. Antennes dentées sur leur face interne atteignant au moins le milieu des élytres.  
Activité : juillet-août

*Prionus coriarius*  
Prione Tanneur



Taille moyenne : 18 à 45 mm.  
Corps robustes.  
Antennes très courtes et dentées.  
Pronotum avec 3 fortes épines.  
Activité : juillet-août

*Aromia moschata*  
Aromie musquée



Taille moyenne : 13 à 35 mm.  
Entièrement vert métallique bleuté. Antennes au moins aussi longues que le corps.  
Activité : juillet-août

*Cerambyx scopolii*  
Petit Capricorne



Répartition en ÎdF du Petit Capricorne



@GeoNatIdF

### Comment participer ?

Pour contribuer, prenez une **photo du petit capricorne**, notez la localisation, la date, le contexte (ex : clairière, verger, jardin) et saisissez vos données via le portail de la **base naturaliste GeoNat'ÎdF** ou transmettez-les nous à l'adresse : [enquete@insectes.org](mailto:enquete@insectes.org)

Le Petit Capricorne est un longicorne commun en région Île-de-France. Insecte se nourrissant de bois mort (saproxylophage), il est dépendant de la présence de vieux feuillus et de bois mort en milieu ensoleillé. Cette enquête constitue une base de travail participatif pour préciser sa répartition actuelle sur notre territoire. Quelque soit le longicorne observé et identifié, les données récoltées seront très utiles pour le futur atlas des longicornes d'Île-de-France !

**GEONAT'ÎdF**  
Base de données naturalistes

